



UKRAINISCH



МЕТАСТАТИЧНИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Metastasierter Brustkrebs

Ваш посібник з лікування

Kisqali – розуміння терапії та її впровадження в повсякденні

Тільки для пацієнок, яким вже призначили Kisqali.

Люба пацієнтко,

Ваш лікар обрав для Вас *для лікування запущеного метастатичного раку молочної залози* Kisqali® (Рибоцикліб).

Звісно, це викликає запитання: Що таке Kisqali? Як працює препарат, як його приймати, чого очікувати від лікування?

У цій брошурі Ви знайдете відповіді

Ця брошура містить важливу інформацію зі згаданих тем. Її призначення — полегшити для Вас використання препарату та допомогти Вам максимально ефективно пройти лікування.

Після її прочитання у Вас можуть виникнути нові запитання. Зверніться з ними до свого лікаря. Обговоріть будь-які сумніви щодо лікування, які у Вас можуть виникнути.



Незрозумілі терміни?

Вам допоможе глосарій наприкінці брошури. У ньому пояснюються різні терміни, що використовуються в цій брошурі. Терміни з глосарію при першому згадуванні надруковані *курсивом*.



Відверте спілкування з Вашими лікарями є важливою основою Вашої терапії.

Зміст

| | |
|---|-----------|
| Kisqali | 4 |
| Про Kisqali | 4 |
| Як діє Kisqali? | 6 |
| Прийом | 8 |
| Початок лікування препаратом Kisqali | 8 |
| Як приймати Kisqali | 10 |
| Схема лікування | 14 |
| Побічні ефекти | 17 |
| Які можуть бути побічні ефекти? | 17 |
| Рекомендації щодо подолання побічних ефектів | 18 |
| Якщо у Вас виникли наступні симптоми, слід бути обережними та звернутися до лікаря | 20 |
| Підтримка | 22 |
| Підтримка допомагає зорієнтуватися | 22 |
| Комунікація дає опору | 23 |
| Глосарій | 24 |
| Три питання щастя | 26 |

Про Kisqali

Новина про те, що у Вас запущена стадія метастатичного раку молочної залози, змінить Ваше життя. Дізнатися про лікування — важливий перший крок у подоланні діагнозу. Що більше Ви знаєте, то краще зможете впевнено та з надією дивитися на виклики.

Що таке Kisqali та для чого він використовується?

Препарат містить активний складник рибоцикліб, який належить до класу препаратів, що називаються інгібіторами CDK4/6. Він діє шляхом пригнічення *білків* CDK4 та CDK6, які регулюють ріст і поділ клітин. Впливаючи на активність цих білків, рибоцикліб може уповільнити ріст ракових клітин та затримати прогресування раку.

Рибоцикліб призначається в комбінації з *інгібітором ароматази* (напр., *Летрозолом*) або *Фулвестрантом* для лікування запущеного метастатичного раку молочної залози у жінок.

Жінки, які ще не досягли менопаузи, також отримують так званий *агоніст ЛГРГ* (ЛГРГ = лютеїнізуючий гормон-релізінг-гормон).



Лікування рибоциклібом та інгібітором ароматази або фулвестрантом є цілеспрямованою терапією запущеного метастатичного раку молочної залози.



Як діє Kisqali?


Щоб залишатися здоровими, клітини організму діляться. Для цього процесу їм потрібні сигнали росту від організму. Раківі клітини використовують ці сигнали росту для неконтрольованого поділу.

Одна з цілей лікування раку — зупинити неконтрольований поділ ракових клітин, зупинити поширення раку.


Рибоцикліб та інгібітори ароматази, або фулвестрант, діють по-різному, пригнічуючи ріст пухлинних клітин:

інгібітори ароматази, або фулвестрант, пригнічують вироблення *естрогену*. Інгібітори CDK4/6 переривають роботу білків CDK4 та CDK6, тим самим запобігаючи надмірному поділу пухлинних клітин.

У жінок до або під час менопаузи лікування рибоциклібом та інгібітором ароматази або фулвестрантом, слід поєднувати з агоністом ЛГРГ. Це пригнічує вивільнення естрогену.



Лікування рибоциклібом та інгібітором ароматази або фулвестрантом



Рибоцикліб та інгібітор ароматази або фулвестрант можуть уповільнити поширення раку завдяки взаємодії їхніх механізмів дії.

Початок лікування препаратом Kisqali

Перед початком лікування необхідно повідомити Вашого лікаря,

- якщо у Вас лихоманка (38°C або вище), біль у горлі або виразки в роті через інфекції (брак лейкоцитів).
- якщо у Вас проблеми з печінкою або якщо у Вашому анамнезі є захворювання печінки.
- якщо у Вас зараз є або були раніше проблеми із серцем або серцеві аритмії.
- якщо у Вас алергія на будь-який зі складників препарату, наприклад, на активний компонент рибоцикліб, арахіс або сою, тоді Вам не слід приймати Kisqali.



Отримайте максимальну користь від цього лікування

Ваша команда лікарів зробить усе можливе для забезпечення оптимальної терапії. Для цього необхідно регулярно проходити медичні огляди.

- Упродовж перших 6 місяців з початку лікування Ваш лікар проводитиме регулярні огляди. Справа в тому, що *побічні ефекти* (зміни в аналізі крові) часами не легко виявити.

Буде проведено такі планові обстеження:



Аналізи крові для вимірювання певних компонентів у крові, таких як печінкові *ферменти* та *електроліти* (солі)



Електрокардіограма (ЕКГ) для перевірки електричної активності Вашого серця

- Результати аналізів допоможуть Вашим лікарям виявити потенційні побічні ефекти.
- За 6 місяців Ваш лікар вирішить, чи потрібні подальші аналізи і як часто.



Медичне обстеження може виявити потенційні побічні ефекти та допомогти Вам дотримуватися плану лікування.

Як приймати Kisqali



Прийом рибоциклібу з інгібітором ароматази

Рекомендована доза становить три таблетки рибоциклібу (сумарно 600 мг) та одну таблетку інгібітора ароматази — все разом один раз на день.

Рибоцикліб можна приймати з їжею або без їжі.



Не їжте **грейпфрутів** і не пийте **грейпфрутового соку** під час прийому рибоциклібу.

Ви ще не досягли менопаузи.



У жінок у пре- або постменопаузі лікування слід поєднувати з так званим агоністом ЛГРГ (ЛГРГ = лютеїнізуючий гормон-релізінг-гормон).



При прийомі рибоциклібу разом з фулвестрантом

Рекомендована доза становить три таблетки рибоциклібу один раз на день (сумарно 600 мг).

Крім того, фулвестрант вводять внутрішньом'язово на 1-й, 15-й та 29-й дні лікування, а потім роблять ін'єкцію один раз на місяць.

Приймати 1 раз на день, бажано вранці



Таблетки рибоциклібу слід ковтати цілими: не розжовуйте, не подрібнюйте та не розколюйте таблетки перед ковтанням!



Всю інформацію про зберігання таблеток можна знайти в листівці-вкладці.



Рибоцикліб призначають разом з інгібітором ароматази або фулвестрантом упродовж 28-денного циклу.


| 28-денний цикл | Тиждень 1 | Тиждень 2 | Тиждень 3 | Тиждень 4 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Рибоцикліб 600 мг 1 раз на день, прийом 3 тижні, 1 тиждень перерви | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| + інгібітор ароматази 1 раз на день безперервний прийом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

або

| 28-денний цикл | Тиждень 1 | Тиждень 2 | Тиждень 3 | Тиждень 4 |
|--|--|--|--|---|
| Рибоцикліб 600 мг 1 раз на день, прийом 3 тижні, 1 тиждень перерви | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | День 1 | День 15 | День 29 | 1 раз на місяць |
| + фулвестрант в.м. ін'єкція 1 раз на місяць плюс додатково 1 раз за 14 днів та 1 раз за 29 днів після першої ін'єкції |  |  |  |  |

✓ Лікування проводиться 1 раз на день упродовж відповідного тижня циклу.

✗ Лікування не проводиться впродовж відповідного тижня циклу.

 Фулвестрант вводять внутрішньом'язово на 1, 15 та 29 дні лікування, а потім 1 раз на місяць.

Жінкам у пременопаузі або постменопаузі лікування слід поєднувати з так званим агоністом ЛГРГ.

Завжди дотримуйтесь циклу лікування, призначеного Вашим лікарем.



Що робити, якщо ...

- **Ви забули прийняти свої таблетки:**

Не слід приймати подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену.

Натомість зачекайте, коли настане час наступної *дози*, і прийміть звичайну кількість таблеток.

- **Якщо Ви випадково прийняли забагато таблеток:**

Негайно зверніться до лікаря або до лікарні.



Не змінюйте дозу або схему лікування препаратом Kisqali без попередньої консультації з лікарем.

Схема лікування

Упаковка Kisqali продумана так, щоб Вам було легше правильно приймати таблетки.

Календар дозування на кожній упаковці допоможе Вам приймати їх упродовж усього циклу лікування.



Поради, які допоможуть Вам не забути про щоденний прийом:



Записуйте свою добову дозу у щоденник та/або на упаковці.



Приймайте таблетки в процесі щоденної діяльності, наприклад, за сніданком, після чищення зубів або під час ранкової гімнастики.



Попросіть родину та друзів нагадувати Вам про прийом ліків.



Встановіть будильник на своєму смартфоні або годиннику.

Ваш щоденник із календарем дозування

Ви можете відстежувати прийом таблеток за допомогою календаря прийому у своєму щоденнику. Для цього просто обводьте кожен день стількома колами, скільки Ви прийняли таблеток рибоциклібу, таблеток інгібітора ароматази або фулвестранту.

Kisqali + Фулвестрант

Дата з ...**23.09**..... до ...**20.10**.....



ПРИКЛАД

| День тижня | Субота | Неділя | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|--------|----------|
| Тижень 1 Kisqali + фулвестрант | ✓✓✓ + ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Тижень 2 Kisqali | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ○ ○ ○ |
| Тижень 3 Kisqali + фулвестрант | ○ ○ ○ + ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
| Тижень 4 | | | | | | | |

+ агоніст ЛГРГ так ні

| Тижень | Субота | Неділя | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Тижень 1 | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ |
| Тижень 2 | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ |
| Тижень 3 | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ |
| Тижень 4 | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ | ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ |

Якщо лікар скоригує Ваше лікування або призначить Вам тимчасово припинити лікування рибоциклібом, зверніть увагу на наступне:

- Не змінюйте дозу самостійно.
- Продовжуйте приймати інгібітор ароматази.
- Продовжуйте приймати фулвестрант на 1-й, 15-й та 29-й дні лікування, після цього — 1 раз на місяць.
- Якщо у Вас ще немає менопаузи, продовжуйте приймати також агоніст ЛГРГ.

Щоденник, у якому можна фіксувати прийом ліків, можна отримати у Вашого лікаря або за телефоном гарячої лінії інформаційного обслуговування Novartis (телефон: +49 911 273 12 100^a; info@novartis.com).

Пн.–Пт. з 8:00 до 18:00.

Які можуть бути побічні ефекти?

Рибоцикліб слід приймати разом з препаратом Летрозол або іншим інгібітором ароматази чи фулвестрантом. Як і всі ліки, ці два препарати можуть викликати побічні ефекти, хоча й не у всіх.



Більшість побічних ефектів, що виникають при застосуванні рибоциклібу в поєднанні з інгібітором ароматази або фулвестрантом, легкі або помірні.

Це означає, що вони можуть викликати дискомфорт, але повинні мати незначний вплив на повсякденне життя.

Деякі можливі побічні ефекти можуть викликати нудоту та блювоту, діарею, втому або витончення/випадіння волосся. Додаткову інформацію про можливі симптоми та побічні ефекти, а також про те, як їх позбутися, можна знайти на наступних сторінках.

Зверніть увагу

У цій листівці наведено не повний перелік усіх можливих побічних ефектів. Читайте листівку-вкладку до Вашого препарату.



Рекомендації щодо подолання побічних ефектів



При нудоті та блювоті

- Приймайте ліки під час їжі, а не натщесерце.
- Їжте меншими порціями частіше та перекусіть перед сном.
- Пийте прозорі рідини (бажано холодні), такі як вода, імбирний або трав'яний чай, щоб уникнути зневоднення.
- Уникайте продуктів, які можуть посилити нудоту (наприклад, гостра, жирна або солодка їжа).
- Вибирайте продукти, що легко засвоюються, такі як індичка, печиво, каша, кренделі, рис або прозорі супи.
- Робіть фізичні вправи на свіжому повітрі.



При діарейі

- Їжте невеликими порціями впродовж дня
- Уникайте молочних продуктів, алкоголю, тютюну, напоїв з кофеїном, а також гострих, жирних (наприклад, смажених або запечених) страв і продуктів, багатих на клітковину (наприклад, цільнозернові продукти, бобові).
- Уникайте сирих фруктів та овочів, а також кислих фруктів та соків.
- Пийте велику кількість прозорих рідин, таких як імбирний або трав'яний чай, щоб уникнути зневоднення.



При відчутті слабкості або втоми

- Розділіть свою фізичну активність упродовж дня.
- Дотримуйтеся регулярного режиму сну.
- Робіть перерву на короткий сон.
- Дотримуйтеся збалансованого харчування.
- Робіть фізичні вправи на свіжому повітрі.
Навіть 15 хвилин можуть значно відновити Ваш рівень енергії.
- Не керуйте транспортними засобами та не працюйте з обладнанням, якщо відчуваєте слабкість або запаморочення.



При витонченні/випадінні волосся

- Обережно мийте та розчісуйте волосся.
- Використовуйте сонцезахисний крем широкого спектру дії з SPF 30 або вище та носіть капелюх, щоб захистити шкіру голови від сонця.



Зверніться до свого лікаря, якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, перелічені тут або в інструкції, або якщо Вам потрібна допомога, щоб їх подолати.



Якщо у Вас виникли наступні симптоми, слід бути обережними та звернутися до лікаря

Негайно поінформуйте свого лікаря, якщо у Вас:



Низький рівень різних типів кров'яних тілець

- Лихоманка, озноб
- Відчуття неприємності
- Часто виникають інфекції з такими симптомами, як біль у горлі або виразки в роті



Серйозні проблеми з печінкою

- Жовтий колір шкіри або пожовтіння білків очей
- Темна або коричнева сеча
- Нудота або блювота
- Біль у правій верхній частині живота
- Схильність до кровотеч або синців



Ознаки проблем із серцем

- Біль або стиснення у грудях
- Зміна серцебиття (прискорене або уповільнене)
- Пальпітація
- Почуття оглушеності, неприємності, запаморочення
- Посиніння губ
- Задишка
- набряк нижніх кінцівок або шкіри

Негайно поінформуйте свого лікаря, якщо у Вас:



Шкірні реакції

- Поширений висип, почервоніння шкіри, пухирі на губах, очах або в роті, лущення шкіри, пошкодження слизової оболонки
- Пітливість, лихоманка
- Свербіння, сухість або жовтий колір шкіри
- Синці



Ознаки сепсису (інфекції в кровоносній системі)

- Серйозна інфекція з підвищенням частоти серцевих скорочень
- Задишка або прискорене дихання
- Лихоманка та озноб



Інтерстиціальне захворювання легень/ пневмоніт

- Запалення легень
- Сухий кашель
- Біль у грудях, лихоманка
- Задишка та утруднене дихання



Можливі симптоми

- Кашель, задишка
- Головний біль
- Запори
- Біль у спині
- М'язові судоми
- Часті інфекції
- Сухість в очах

Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, важливо сповістити про це свого лікаря, щоб він міг призначити Вам лікування, якщо це необхідно.

Вам можна дати такі поради:

- Зміна стилю життя
- Прийом інших ліків окрім Kisqali та інгібітора ароматази або фулвестранту
- Тимчасове переривання лікування або зменшення дози Kisqali

Підтримка допомагає зорієнтуватися

За належної підтримки Ви зможете взяти своє повсякденне життя під контроль.

Скористайтеся багатьма видами допомоги

Під час лікування виникають нові питання – це нормально. Ця брошура допоможе Вам опанувати терапію та впровадити її у своє повсякденне життя.

Окрім Вашого лікаря, організації, що підтримують пацієнтів, також можуть надати Вам додаткову цінну інформацію. На бічній панелі Ви знайдете вебсайти для отримання додаткової інформації про Ваш діагноз та лікування, а також допомогу у вирішенні медичних питань та повсякденних справ.

Найважливіша інформація завжди під рукою

У повсякденному житті не тільки виникатимуть нові питання, але й повторюватимуться певні терапевтичні процедури. Ви також можете добре підготуватися до цього за допомогою ресурсів.

Ми надаємо матеріали, які будуть із Вами щодня:

- Паспорт пацієнта містить важливу інформацію про Ваше лікування, зокрема дозування, час прийому та вказівки з безпеки; паспорт також містить картку пацієнта для Вашого гаманця.
- Паспорт взаємодії допоможе фармацевту звертати увагу на можливу несумісність між іншими ліками та Kisqali, інгібітором ароматази або фулвестрантом під час реалізації рецептів.
- Щоденник допомагає Вам щодня документувати прийом таблеток.

Комунікація дає опору

Будуйте довірчі стосунки з іншими жінками із запущеним метастатичним раком молочної залози та не соромтеся звертатися до свого лікаря з будь-якими питаннями чи занепокоєннями.

Більше інформації про рак молочної залози та лікування Вашого захворювання можна знайти на наступному вебсайті:

Життя з раком молочної залози

www.Leben-mit-Brustkrebs.de

Організації, які можуть допомогти Вам знайти підтримку:

Альянс боротьби з раком молочної залози

www.allianz-gegen-brustkrebs.de

Самодопомога у жінок після раку

www.frauenselbsthilfe.de

Рак молочної залози в Німеччині

www.brustkrebsdeutschland.de

Mamazone

www.mamazone.de



Ініціатива MyTime – Кожна мить є цінною

Спільний проєкт «Мамма Mia! Журнал про рак молочної залози»,
Brustkrebs Deutschland e. V. та Novartis

Facebook: @Mytime.LebenmitBrustkrebs

«Коли у Вас запущений метастатичний рак молочної залози, земля йде з-під ніг. Заспокоює усвідомлення того, що я не сама».

Глосарій



Агоніст ЛГРГ

Зменшує вироблення естрогену та, відповідно, його концентрацію в організмі

Білок

Велика молекула, що складається з ланцюга невеликих хімічних сполук, які називаються амінокислотами. Білки формують структуру всіх клітин і контролюють їхню роботу.

Гормон

Хімічна речовина в організмі, яка контролює діяльність клітин або органів

Гормон-рецептор-позитивний (HR+)

Вказує на ракові клітини з гормональними рецепторами. Гормони потрапляють у клітини через ці *рецептори* та сприяють росту пухлини.

Доза

Кількість ліків, що приймаються одночасно

Електрокардіограма (ЕКГ)

Дослідження, яке показує діяльність серця у вигляді лінійного графіка. Одним із захворювань серця, яке може виявити ЕКГ, є подовження інтервалу QTc, коли час між серцевими скороченнями довший, ніж зазвичай.

Електроліти

Мінерали в крові з електричним зарядом, які впливають на різні функції організму

Естроген

Гормон, який природним чином виробляється в організмі та може сприяти росту ракових клітин

Інгібітор ароматази

Група препаратів, що зменшують кількість гормону естрогену, що виробляється організмом

Лейкоцити

Тип кров'яних тілець, що використовуються організмом для боротьби з інфекціями

Летрозол

Препарат, що використовується для зменшення кількості естрогену, що виробляється організмом, що може уповільнити ріст гормон-рецептор-позитивних ракових клітин

Метастатичний рак молочної залози

Запущене захворювання, при якому вторинні пухлини утворилися в інших частинах тіла

Побічний ефект

Небажаний симптом, спричинений лікуванням

Прогресування

Коли рак погіршується або поширюється після досліджень або лікування

Рецептор

Білок всередині або на поверхні клітини, з яким можуть зв'язуватися речовини

Фермент

Речовина в живих організмах, яка запускає хімічні реакції

Фулвестрант

Блокує дію естрогену в організмі, що може уповільнити ріст *гормон-рецептор-позитивних* ракових клітин

Цикл

Період лікування, який регулярно повторюється з періодами відпочинку між ними

Авторські права на фотографії

Стокові фотографії з Getty Images.

Фотографії моделей.

Заголовок: © Jacob Wackershausen

С. 5: © shurkin_son

С. 7: © jeffbergen

С. 8: © MangoStar_Studio

С. 11: © MStudioImages

С. 13: © Portra

С. 17: © Warowee Meepian

С. 19: © Drazen Zigic

Три питання щастя

Чудовою звичкою – майже ритуалом – є 3 питання щастя.

Доктор Люк Ізеберт розробив цей інструмент, який вже допоміг багатьом людям віднайти щастя.

Можливо, Вам допоможе записувати запитання та відповіді у спеціальну книгу щастя та читати її перед сном.

1. Що я зробила сьогодні, що зробило мене щасливою або задоволеною?

.....
.....

2. Що інші зробили сьогодні, що зробило мене щасливою?
Що я зробила в результаті, щоб інші знали про це або зробили це знову?

.....
.....

3. Що я сьогодні почула, який помітила запах, відчула, побачила або пережила, що зробило мене щасливою?

.....
.....

Нотатки



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



У медичній інформаційній службі лікарі, фармацевти та науковці з радістю дадуть відповіді на Ваші запитання та нададуть всю необхідну інформацію.



Інформація про продукти Novartis щодо...

- прийому та дії препаратів та активних компонентів
- застосування, використання та зберігання
- поєднання та взаємодії з іншими ліками та речовинами
- показань, довідкової інформації про захворювання та методи лікування

Ми пропонуємо...

- Індивідуальну інформацію під час особистої консультації
- Інформаційні матеріали та довідку про послуги

Телефон

+49 911 273 12 100^a

Ел. пошта

infoservice.novartis@novartis.com

Вебсайт

www.infoservice.novartis.de

Живий чат

www.chat.novartis.de^a

Факс

+49 911 273 12 160

Пн.–Пт. з 8:00 до 18:00.

Зверніть увагу:

Спілкування за вказаними номерами телефону та адресою електронної пошти, як правило, відбувається німецькою мовою.

Novartis Pharma GmbH

Nürnberg

www.novartis.de

www.leben-mit-brustkrebs.de

 NOVARTIS